


« L'asthme est caractérisé par une inflammation des voies respiratoires. Les symptômes sont une difficulté à respirer, un essoufflement, une respiration sifflante ou une sensation d'oppression dans la poitrine (Agence de la santé publique du Canada, 2011). L'asthme est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants (OMS, 2011). En plus d'être en moins bonne santé, les enfants atteints d'asthme peuvent être limités dans leurs activités quotidiennes et utilisent plus souvent des services en santé (p. ex., consultation médicale, urgence, hospitalisation), ce qui contribue au fardeau de la maladie. D'ailleurs, les symptômes de l'asthme seraient une des premières causes de l'absentéisme scolaire (Kohen, 2010). [...] Plusieurs facteurs environnementaux, tels la fumée du tabac, l'humidité ou les allergènes, peuvent déclencher ou exacerber les crises d'asthme (Kaszniak-Kocot et autres, 2010; McFadden, 2001; Asher et autres, 2006) ». (INSPQ, Fiche indicateur de l'Infocentre, 2012, page 1)

En 2013-2014, **11 %** de la population de 12 ans et plus en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine souffre d'asthme, soit environ 8 500 personnes.

Comparaison entre la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Québec

Selon l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014¹ (ESCC), 11 % des personnes de 12 ans et plus vivant en ménage privé en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont déjà reçu d'un professionnel de la santé un diagnostic d'asthme, une proportion qui ne se différencie pas de celle du Québec (8,7 %) (figure 1). En fait, de manière générale, la région ne se distingue pas du Québec, peu importe le sexe et le groupe d'âge (tableau 1).

Figure 1 : Proportion (en %) de la population de 12 ans et plus vivant en ménage privé ayant déjà reçu un diagnostic d'asthme par un professionnel de la santé, 2013-2014



Groupes plus nombreux à souffrir d'asthme

Au Québec, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de souffrir d'asthme, une tendance quoique non significative aussi observée en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (13 % contre 8,4 %) (tableau 1). Au chapitre de l'âge, les jeunes québécois de

12-24 ans sont, toutes proportions gardées, plus nombreux que les autres groupes d'âge à avoir déjà eu un diagnostic d'asthme. Les données régionales, assorties par ailleurs d'une très grande imprécision quand on les découpe selon l'âge, ne permettent pas de conclure de la sorte (voir à la page suivante les données spécifiques sur les jeunes du secondaire). Enfin, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine comme au Québec, la proportion de personnes déclarant avoir déjà eu un diagnostic d'asthme est plus élevée chez celles vivant dans les ménages au revenu les plus faibles (tableau 1).

Évolution de la prévalence de l'asthme

Selon l'ESCC, la prévalence de l'asthme n'a pas connu de variation significative depuis 2000-2001, et ce, dans la région et au Québec (résultat non illustré).

Tableau 1 : Proportion (en %) de la population de 12 ans et plus vivant en ménage privé ayant déjà reçu un diagnostic d'asthme par un professionnel de la santé, 2013-2014

	Gaspésie-Îles	Québec
Sexe		
Hommes	8,4*	7,7
Femmes	12,8*	9,7
Groupe d'âge		
12-24 ans	8,4**	10,7
25-44 ans	13,9**+	8,0
45-64 ans	8,2*	8,1
65 ans et plus	12,9*	9,2
Revenu du ménage[†] (échelle régionale)		
Quintile 1 (inférieur)	21,3*	11,8
Quintile 2	9,5**	8,8
Quintile 3	9,9**	7,4
Quintile 4	3,6**	8,3
Quintile 5 (supérieur)	7,7**	7,3
TOTAL	10,6	8,7

Symboles : † Signifie que les pourcentages obtenus dans la région dans les différentes catégories de cette variable se différencient statistiquement.

+ ou - Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05. *Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence. ** CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Sources : Population 12 ans et plus : Statistique Canada, ESCC 2000-2001 à 2013-2014, données extraites de l'Infocentre de santé publique. Jeunes du secondaire : Institut de la Statistique du Québec, EQSJS 2010-2011, données extraites de l'Infocentre de santé publique.


Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, juin 2017.

¹ Cette enquête a une portée provinciale et régionale, si bien qu'elle ne fournit aucune donnée à l'échelle locale.

L'asthme chez les jeunes du secondaire

En 2010-2011, **22 %** des jeunes du secondaire en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine souffrent d'asthme.

Figure 2 : Proportion (en %) des jeunes du secondaire ayant eu des sifflements à la poitrine, des symptômes d'asthme ou des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois, 2010-2011



Comparaison entre la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Québec

Selon l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011 (EQSJS), la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine compte, toutes proportions gardées, davantage de jeunes souffrant d'asthme que le Québec, c'est-à-dire des jeunes qui ont eu des sifflements à la poitrine, des symptômes d'asthme ou des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois (24 % contre 22 %) (figure 2). Comme on le constate au tableau 2, ce résultat en défaveur de la région tend à s'observer peu importe les caractéristiques des jeunes, bien que seuls les jeunes de la 5^e secondaire se distinguent significativement de ceux du Québec.

Groupes plus nombreux à souffrir d'asthme

Dans la région comme au Québec, les filles sont plus nombreuses que les garçons, en proportion, à souffrir d'asthme (tableau 2). De même, la prévalence de ce problème augmente avec le niveau de scolaire, la proportion ayant eu des sifflements à la poitrine, des symptômes d'asthme ou des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois passant de 18 % à 30 % entre la 1^{re} et la 5^e secondaire en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. De même, la proportion à souffrir de ce problème de santé est plus élevée chez les élèves dont les parents n'ont pas de diplôme d'études secondaires (33 % contre environ 24 % chez les autres élèves) (tableau 2). Cet indicateur n'est cependant pas associé à la langue d'enseignement.

Évolution de la prévalence de l'asthme

C'était la première fois en 2010-2011 que cet indicateur était mesuré chez les jeunes du secondaire de la région. Nous n'avons donc pas de données historiques sur cet indicateur.

Tableau 2 : Proportion (en %) des jeunes du secondaire ayant eu des sifflements à la poitrine, des symptômes d'asthme ou des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois, 2010-2011

	Gaspésie-Îles	Québec
Sexe†		
Garçons	20,9	19,0
Fillles	27,3	24,5
Niveau scolaire†		
1 ^{re} secondaire	18,0	19,6
2 ^e secondaire	23,8	21,0
3 ^e secondaire	24,5	22,5
4 ^e secondaire	25,6	23,2
5 ^e secondaire	29,7+	22,4
Langue d'enseignement		
Français	24,4	21,9
Anglais	20,4*	20,0
Scolarité des parents†		
Sans DES	33,4	27,7
Avec DES	24,0	23,0
Études collégiales ou universitaires	23,4	21,2
TOTAL	24,1+	21,7